

FICHA TÉCNICA



Confidor 350®

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC).

INGREDIENTE ACTIVO: Imidacloprid.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:

Insecticida formulado como suspensión concentrada con 350 g de Imidacloprid por litro de formulación.

ACCIÓN FITOSANITARIA: CONFIDOR® tiene alta fitocompatibilidad en cultivos como tomate, flores, tabaco, pimiento, melón, sandía, arroz, soya, algodón, cítricos y otros frutales. Ha demostrado en la práctica excelentes resultados sobre los estadios inmaduros (ninfas, larvas) así como también sobre adultos de los insectos. Por su novedoso mecanismo de acción, controla satisfactoriamente plagas que han desarrollado resistencia a otros insecticidas.

MODO DE ACCIÓN: CONFIDOR® es un insecticida de acción sistémica y de contacto. Tiene movimiento acropetal (hacia arriba), de esta forma protege los puntos de crecimiento de la planta.

MECANISMO DE ACCIÓN: Insecticida sistémico con actividad translaminar y de contacto con acción estomacal. Fácilmente absorbido por la planta y distribuido completamente, con buena acción sistémica en la raíz. Actúa como un antagonista mediante la unión a receptores nicotínicos postsinápticos en el sistema nervioso central de los insectos.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: En cultivos de ciclo corto se recomiendan máximo dos aplicaciones entre los primeros treinta días de desarrollo de la planta. En Rosa se recomienda 2 aplicaciones en bloque cada 7 días durante la rotación.

PERIODO DE CARENCIA: Rosa no aplica.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de CONFIDOR 350, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua. Se aconseja hacer una pre-mezcla en un volumen menor de agua, luego se agrega el resto de agua. Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares. Tiene muy buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados siguiendo las indicaciones de uso.

COMPATIBILIDAD DE MEZCLA: Es compatible con la mayoría de insecticidas de uso comercial sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad, no mezclar con otros fungicidas, fertilizantes o herbicidas.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: III (Ligeramente peligroso).
Toxicidad oral aguda: 450 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: > 5 000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: 5 323 mg/m3

COMPATIBILIDAD CON EL CULTIVO: No presenta fitotoxicidad utilizado a la dosis recomendada y con los métodos sugeridos

PRECAUCIONES: Almacene el producto fuera del alcance de los niños, bajo llave, en un sitio seguro, fresco, seco y bien ventilado, separado de alimentos y drogas de consumo humano o animal, ropa, calzado y utensilios del hogar.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de ingestión no induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.

GUÍA PARA EL MÉDICO:
Tratamientos: Tratamiento sintomático.
Antídoto: No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.
"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa cuando corresponda."

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 horas del día.

PRESENTACIONES:

Envase x 100 cc.
Frasco x 1 L

REGISTRO NACIONAL: 68-1 2 / NA

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC (Periodo de Carencia)
ROSA <i>Rosa sp.</i>	Áfidos <i>Myzus persicae</i>	0.2 l/ha o 200 cc/ha	No aplica
UVA <i>Vitis vinifera</i> L.	Filoxera <i>Phylloxera vitifoliae</i>	1.5 l/ha (drench) 100cc /tanque (foliar)	21 días
	Planococcus <i>Planococcus citri</i>	1.5 l/ha	30 días

Bayer S.A.
Calle Luxemburgo N34-359 y Portugal, Edificio Cosmopolitan piso 6
Quito - Ecuador

Tel +593 (2) 3975200
Línea de Servicio al Cliente 1800-2293772
www.bayerandina.com