



Nombre: **GAMIT®48**

Enero 2019

Página 1 de 3

FICHA TECNICA
GAMIT®48
HERBICIDA AGRICOLA
Concentrado Emulsionable (EC)

REGISTRO NACIONAL: 85-H7/NA
Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente Activo:

Clomazone i.a......**480 g/l.**
2-(2-clorobencil)-4,4-dimetil-1,2-oxazolidin-3-ona; 2-(2-clorobencil)-4,4-dimetiloxazolidin-3-ona, de formulación 20° centígrados

Solvent naphtha (petroleum)**446 g/l.**

Aditivos: **c.s.p. 1 Litro.**

GENERALIDADES

GAMIT®48 es un herbicida selectivo, absorbido por las raíces y brotes, y es translocado en forma ascendente hacia las hojas. Su acción herbicida la desarrolla al inhibir la biosíntesis de pigmentos fotosintéticos. Las especies susceptibles emergen blancas por falta de clorofila, muriendo al poco tiempo.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC*
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	Paja de arroz (<i>Echinochloa colorum</i>) Caminadora (<i>Rottboellia exaltata</i>)	1,25 l/ha	N/A

*PC: Periodo de carencia N/A: No aplica

Periodo de reingreso: 24 horas, en caso de requerir ingresar al cultivo antes de este periodo, usar equipo de protección personal completo.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

Pre-siembra: Malezas gramíneas de hasta 1 hoja. Acompañando postemergentes para "Quemas"

Pre-emergencia: Después de la siembra de arroz y antes de las malezas.

Post-emergencia temprana: sobre arroz hasta 15 días después de emergencia y malezas gramíneas de hasta 1 hoja. Acompañando postemergentes para "sello"

PRECAUCIONES EN LAS APLICACIONES

Cuando se usan repetidamente herbicidas del mismo modo de acción durante varios años para controlar las mismas especies de malezas en un mismo campo, biotipos resistentes de malezas de ocurrencia natural pueden sobrevivir a las aplicaciones correctas de herbicidas, propagándose y llegando a ser dominantes en

ese campo. Prácticas culturales tales como: cultivar mecánicamente, evitar que las malezas semillen y el uso de herbicidas de diferente modo de acción, dentro del ciclo del cultivo o entre ciclos de cultivos, pueden ayudar a retardar la aparición de biotipos resistentes y, su posible proliferación y dominancia.

El arrastre ó deriva de las aplicaciones del herbicida **GAMIT®48** puede ocasionar blanqueamiento foliar ó amarilla miento en el caso de algunos cultivos. No aplique **GAMIT®48** en lugares localizados a distancias inferiores a 300 m de pueblos ó caseríos, cultivos de hortalizas, flores, algodón y sorgo, así como viveros e invernaderos. No se aplique cuando las condiciones de viento favorezcan el arrastre ó deriva. Se debe ajustar y calibrar el equipo para producir gota grande sin afectar el patrón de distribución de la aspersion sobre el cultivo pero que evite gota pequeña ó fina, susceptible a la deriva ó arrastre.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Llene el tanque de mezcla hasta 1/4 con agua, comience a agitar; adicione el **GAMIT®48** y complete el nivel del agua. Use de 200-400 litros de agua por hectárea en aplicación terrestre y 55-75 litros (15-20 gal) por hectárea en aplicación aérea.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

COMPATIBILIDAD

GAMIT®48 es compatible con los herbicidas pre-emergentes, post-emergente temprano (“sello”) y pre-siembra (“quemá”), frecuentemente usados en el cultivo de arroz.

FITOTOXICIDAD

GAMIT®48, aplicado siguiendo las recomendaciones de esta etiqueta, es seguro a los cultivos del arroz. Algunas veces se observa blanqueamiento (“Albinismo”) de plántulas de arroz; sin embargo, éstas normalmente se recuperan dentro de las 2 a 3 semanas después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- Cuidado, puede causar irritación ocular moderada. Evite aspirar la neblina de aspersion.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Use overol, botas y guantes.

En caso de ingestión suministre uno (1) o dos (2) vasos de agua. **NO INDUZCA AL VÓMITO**. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Consulte a un médico inmediatamente.

En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos. Consulte a un médico si la irritación persiste.

En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua y jabón. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Consulte a médico si la irritación persiste.

En caso de inhalación, lleve al paciente al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, y las molestias persisten, consulte un médico.

GUÍA PARA EL MÉDICO

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela esta Ficha Técnica.



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.

Para mayor información dirigirse a:
FMC LATINOAMERICA S.A. (593 04) 3902086
Guayaquil - Ecuador

ADVERTENCIA: "Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturándolo o perforándolo, y devuélvalo al distribuidor para su disposición final".

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO – DAÑINO**