	FICHA TÉCNICA **SURLAQ ACTIVADOR 25%**	**Revisión:** 04 **Fecha:** 06/Julio/2017 **Página:** 1 de 1

Formulador:	Agripac S.A.
Tipo de Producto:	Coadyuvante Agrícola
Concentración:	Mezcla de Octilfenoxipolietoxietanol + Alquilsulfosuccinato y Polialquilheptametiltrisiloxano 250 g/l
Grupo Químico:	Surfactante no iónico
Nombre Químico:	Poli (oxi-1,2-etanedil), alfa-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenil-omega-hidroxi Diactil sulfozuccinato de sodio + Alfa-1,1,1,3,5,5,5-hepta metiltrisiloxamil-propil-omega-metoxi-poli(oxietileno).
Tipo de Formulación:	Concentrado Soluble (CS)
Categoría Toxicológica:	IV (Franja verde)
Modo de acción:	Surfactante no iónico con propiedades humectantes, esparcidoras y penetrantes. Mejora las condiciones físicas de la aplicación, al conseguir mayor fragmentación de las gotas, logrando mejor cobertura, distribución y adherencia.
Mecanismo de acción:	Disminuye la tensión superficial del agua, permitiendo un mojado uniforme y asegurando una mejor cobertura con la solución asperjada. También aumenta la capacidad de mojado de hojas con superficies cerosas.
Presentaciones Comerciales:	100 ml, 150, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litro, 200 l

N° de Registro:	035 – COAD 1 – SESA – U

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Mezcla con fungicidas, insecticidas, acaricidas y fertilizantes foliares:

VOLUMEN DE APLICACIÓN (l/ha)	DOSIS DE EPYFEN	
	% por volumen	ml /100 l
400 ó más	0.10	100
200 ó más	0.15 – 0.20	150 – 200
Menos de 200	0.25 – 0.50	250 – 500

Mezcla con herbicidas:

VOLUMEN DE APLICACIÓN (l/ha)	DOSIS DE EPYFEN	
	% por volumen	ml /100 l
400 ó más	0.15 – 0.20	150 – 200
200 ó más	0.25 – 0.30	250 – 300
Menos de 200	0.30 – 0.40	300 – 400

Modo de empleo:	Para la preparación de la mezcla, agregue agua en el tanque de aspersión hasta la mitad, adicione los plaguicidas y finalmente agregue la dosis recomendada de SURLAQ ACTIVADOR 25%, complete el volumen requerido con agua manteniendo agitación constante.
Época y frecuencia de aplicación:	De acuerdo al fitosanitario usado.
Período de carencia:	De acuerdo al fitosanitario usado y el tipo de cultivo.
Reingreso al área tratada:	De acuerdo al fitosanitario usado.
Compatibilidad:	Es compatible con la mayoría de fitosanitarios presentes en el mercado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO:
Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).
Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado
Nunca transporte los plaguicidas junto con productos alimenticios.
Después de la aplicación, lavar el equipo de aspersión interna y externamente en el campo y asperjar el líquido de enjuague en el cultivo.
Lavar las boquillas de aspersión con agua a una presión más alta que la normal de aplicación.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Recolectar los envases y entregarlos distribuidor para su disposición final.