



Nombre: **ZINC 700**

Noviembre 2019

Página 1 de 2

FICHA TECNICA ZINC 700

FERTILIZANTE QUIMICO
"APLICACIÓN FOLIAR"

REGISTRO NACIONAL 611-F-AGR
Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Zinc (Zn)70,0 % p/v

"CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL"

GENERALIDADES

ZINC 700 es un producto con alta concentración de Zinc con una especial formulación para el aporte eficiente de zinc, esencial para el crecimiento normal de la planta y el desarrollo. El zinc tiene varias funciones importantes en las plantas, las reacciones enzimáticas, la fotosíntesis, la transcripción del ADN y sobre actividad de auxina. El zinc es un elemento clave en el proceso de fijación del CO₂ atmosférico y por tanto con una clara implicación en la fotosíntesis.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	EPOCA DE APLICACION	VIA Y FRECUENCIA DE APLICACION
Tomate Riñón (<i>Solanum lycopersicum</i>)	0,75 L/ha	Proceso de ramificación y desarrollo vegetativo.	Foliar. Aplicar a partir que se tenga masa foliar suficiente, al inicio del proceso de ramificación y extensión de brotes, repetir si es necesario a medio engorde.
Aguacate (<i>Persea americana</i>)	0,75 L/ha	Desarrollo vegetativo.	Foliar. Aplicar a partir de brotación activa con masa foliar suficiente, repetir si es necesario a medio engorde.
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	0,75 L/ha	Aparecimiento de 3ra hoja, hasta macollaje.	Foliar. Primer tratamiento a partir de 3a hoja hasta macollaje, repitiendo si fuera necesario a los 30 días.
Banano (<i>Mussa acuminata AAA</i>)	0,75 L/ha	Emisión foliar.	Foliar. Aplicar durante todo el ciclo de cultivo. Repetir de acuerdo a la necesidad del cultivo

Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	0,75 L/ha	Al inicio, aparecimiento de 4ª y 8ª hoja.	Foliar. Entre 4ª y 8ª hoja, al inicio de crecimiento vegetativo activo.
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	0,75 L/ha	Desarrollo vegetativo.	Foliar. Aplicar a partir de brotación activa con masa foliar suficiente, repetir si es necesario a medio engorde.
Frutilla (<i>Fragaria sp.</i>)	0,75 L/ha	Proceso de ramificación y desarrollo vegetativo	Foliar. Aplicar a partir que se tenga masa foliar suficiente, al inicio del proceso de ramificación y extensión de brotes, repetir si es necesario a medio engorde.
Mango (<i>Mangifera indica</i>)	0,75 L/ha	Desarrollo vegetativo y brotación.	Foliar. Aplicar a partir de brotación activa con masa foliar suficiente, repetir si es necesario a medio engorde.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	0,75 L/ha	Desarrollo vegetativo activo.	Foliar. Aplicar a partir de desarrollo vegetativo activo, repetir a medio llenado si fuera necesario.
Solidago (<i>Solidago Canadensis</i>)	2,25 L/ha	En fase de crecimiento activo (20 días después de la época)	Tres aplicaciones con un intervalo entre aplicaciones de 7 días.

“La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

AGÍTESE BIEN ANTES ABRIR Y USARLO. El equipo de aspersión debe estar limpio. Llenar la mitad del tanque de pulverización con agua, comenzar la agitación y añadir la cantidad requerida de **ZINC 700** y luego el resto del agua. Enjuague bien el envase y agregue los enjuagues al tanque, complete el llenado y aplique sin demora. Mantener la agitación del tanque durante todo el proceso de aspersión en el campo. No es recomendable aplicar este producto en condiciones de alta radiación solar o con temperaturas ex tremas y bajos niveles de humedad relativa ambiental. Si es posible realice las aplicaciones del producto a primera hora de la mañana o última de la tarde. Limpie bien el equipo de tratamiento después de su uso.

INCOMPATIBILIDAD

ZINC 700 es física y químicamente compatible con la mayoría de productos agroquímicos. Lea siempre cuidadosamente las etiquetas de terceros productos antes de mezclarse con **ZINC 700**. Es recomendable hacer una pequeña prueba de compatibilidad con los productos que se quieran mezclar.

GUÍA PARA EL MÉDICO

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta cuando corresponda”



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.

Para mayor información dirigirse a:
FMC LATINOAMERICA S.A. (593 04) 3902086
Guayaquil - Ecuador