



Nombre: **CARNIVAL**

Noviembre 2019

Página 1 de 3

FICHA TECNICA **CARNIVAL**

FERTILIZANTE QUIMICO
"APLICACIÓN FOLIAR"

REGISTRO NACIONAL 576-F-AGR
Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Nitrógeno (N).....	14,9 % p/v
Calcio (CaO).....	22,5 % p/v
Magnesio (MgO).....	3,0 % p/v
Boro (B).....	0,075 % p/v
Zinc (Zn).....	0,030 % p/v

"CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL"

GENERALIDADES

CARNIVAL: Es un producto especialmente desarrollado para su utilización a lo largo de todo el ciclo del cultivo, desde las necesidades producidas en el enraizado, hasta los tratamientos para la promoción de calidad de cosecha y optimización de la conservación y almacenamiento de las cosechas). El calcio regula la formación y el funcionamiento de las membranas celulares. El magnesio interviene en la formación de la clorofila y otros pigmentos.

CARNIVAL es un fertilizante de alto contenido en calcio con macro y micronutrientes para prevenir y corregir las deficiencias fisiológicas provocadas por la carencia de calcio (bitter pit, cracking o microfisuras, russetting, agrietamiento, tip burn, etc.). Penetra rápidamente en la planta y se metaboliza en el interior de ésta. Es importante para las funciones fisiológicas de los cultivos y mejora notablemente la firmeza y consistencia del fruto.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	EPOCA DE APLICACION	VIA Y FRECUENCIA DE APLICACION
Tomate Riñón (<i>Solanum lycopersicum</i>)	3,50 L/ha, en 1000 L de Agua.	Inicio del cuajado del fruto	FOLIAR. Tres aplicaciones con rangos de 2 semanas entre aplicación.
Aguacate (<i>Persea americana</i>)	0,75 L/ha, en 600 L de agua	Inicio del cuajado del fruto	FOLIAR. Aplicaciones a partir del cuajado, con repeticiones cada 10-14 días hasta una semana antes de recolección.

Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	0,75 L/ha, en 250 L de agua.	En inicio de desarrollo reproductivo.	FOLIAR. Aplicar desde inicio de embuchado 35-45 DDT y/o 40-60 días después de la siembra o transplante..
Banano (<i>Mussa acuminata</i> AAA)	1,0 L/ha, en 20 L de agua (aérea)	Etapa retorno- hijos - floración banano 15 semanas después siembra.	FOLIAR. Aplicaciones aéreas, 4 Ciclos - Cada 15 días.
Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	0,75 L/ha, en 250 L de Agua.	En desarrollo vegetativo.	FOLIAR. Aplicar en pleno desarrollo vegetativo.
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	0,75 L/ha, en 500 L de Agua.	A partir del cuajado y antes de la cosecha.	FOLIAR. Aplicaciones a partir del cuajado, con repeticiones cada 10-14 días hasta una semana antes de recolección
Frutilla (<i>Fragaria sp.</i>)	0,75 L/ha, en 500 L de Agua.	A partir del cuajado y antes de la cosecha.	FOLIAR. Aplicaciones a partir de cuajado, con repeticiones cada 10-14 días hasta una semana antes de recolección.
Mango (<i>Mangifera indica</i>)	0.75 L/ha, en 500 L de Agua.	A partir del cuajado y antes de la cosecha.	FOLIAR. Aplicaciones a partir de cuajado, con repeticiones cada 10-14 días hasta una semana antes de recolección
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	0,75 L/ha, en 500 L de Agua.	Inicio de engorde de tubérculos y a medio llenado	FOLIAR. Aplicar en inicio de engorde de tubérculos y a medio llenado.

“La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

AGÍTESE BIEN ANTES ABRIR Y USARLO. El equipo de aspersión debe estar limpio. Llenar la mitad del tanque de pulverización con agua, comenzar la agitación y añadir la cantidad requerida de **CARNIVAL** y luego el resto del agua. Enjuague bien el envase y agregue los enjuagues al tanque, complete el llenado y aplique sin demora. Mantener la agitación del tanque durante todo el proceso de aspersión en el campo. No es recomendable aplicar este producto en condiciones de alta radiación solar o con temperaturas extremas y bajos niveles de humedad relativa ambiental. Si es posible realice las aplicaciones del producto a primera hora de la mañana o última de la tarde. Limpie bien el equipo de tratamiento después de su uso.

INCOMPATIBILIDAD

CARNIVAL es física y químicamente compatible con la mayoría de productos agroquímicos. Lea siempre cuidadosamente las etiquetas de terceros productos antes de mezclarse con **CARNIVAL**. Es recomendable hacer una pequeña prueba de compatibilidad con los productos que se quieran mezclar.

GUÍA PARA EL MÉDICO

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta cuando corresponda”



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.

Para mayor información dirigirse a:
FMC LATINOAMERICA S.A. (593 04) 3902086
Guayaquil - Ecuador