



Confidor 700

INSECTICIDA AGRÍCOLA
Gránulos dispersables (WG)

INGREDIENTE ACTIVO: Imidacloprid

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:

Insecticida formulado como gránulos dispersables con 700 g de Imidacloprid como ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

ACCIÓN FITOSANITARIA: CONFIDOR 70 WG es un insecticida de acción sistémica y de contacto. Por su alta sistemia y residualidad dentro de la planta puede usarse en tratamientos al follaje, al suelo (drench) y en el sistema de riego, mostrando movimiento acropetal (hacia arriba), de esta forma protege los puntos de crecimiento de la planta.

Posee amplio espectro de acción, controla especialmente insectos chupadores como: Áfidos, moscas blancas y cigarritas. Además controla algunos coleópteros y dípteros entre otras plagas.

CONFIDOR 70 WG tiene alta fitocompatibilidad en cultivos como tomate, flores, tabaco, pimiento, melón, sandía, arroz, soya, algodón, cítricos y otros frutales. Ha demostrado en la práctica excelentes resultados sobre los estadíos inmaduros (ninfas, larvas) así como también sobre adultos de los insectos.

Por su mecanismo de acción, controla satisfactoriamente plagas que han desarrollado resistencia a otros insecticidas.

MODO DE ACCIÓN: CONFIDOR 70 WG actúa en forma sistémica acropetal, por ingestión y por contacto.

MECANISMO DE ACCIÓN: Su mecanismo de acción se basa en la interferencia de la transmisión de los estímulos nerviosos de los insectos. CONFIDOR 70 WG no puede ser desactivado una vez que ingresa al organismo de los insectos.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN.-

Se realizaran dos aplicaciones consecutivas cada 7 días, en presencia de Mosca Blanca (*Trialeurodes vaporariorum*).

MÉTODO DE APLICACIÓN: Para preparar la mezcla vierta la dosis de CONFIDOR 70 WG en poca agua, agite y añada agua hasta completar la cantidad necesaria recomendada de acuerdo al cultivo.

PERIODO DE CARENCIA: CONFIDOR 70 WG debe aplicarse hasta 7 días antes de la cosecha.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II
MODERADAMENTE PELIGROSO

COMPATIBILIDAD DE MEZCLA: CONFIDOR 70 WG se puede mezclar con otros productos de uso común; sin embargo se recomienda hacer pruebas de miscibilidad y fitocompatibilidad previas en pequeña escala.

PRECAUCIONES: El producto puede ser nocivo en caso de inhalación o ingestión. Puede ser tóxico para organismos acuáticos.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de ingestión induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consiga asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.

GUÍA PARA EL MÉDICO: Aplique tratamiento sintomático.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 horas del día.

Para mayor información contactarse con oficinas de Bayer: 023975200 - 0985524044.

PRESENTACIÓN:

Funda x 1 Kg

REGISTRO MAG.: 68-15/ NA

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC
TOMATE RIÑÓN (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	250 gr/ha	7 dias

Bayer S.A.
Calle Luxemburgo N34-359 y Portugal, Edificio Cosmopolitan piso 6
Quito - Ecuador

Tel +593 (2) 3975200
Línea de Servicio al Cliente 1800-2293772
www.bayerandina.com