



DINASTIA® 100 EC

INSECTICIDA PIRETROIDE AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

INGREDIENTE ACTIVO: Deltametrina

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Concentrado emulsionable (EC) que contiene 100 g de ingrediente activo por litro de producto comercial.

ACCIÓN FITOSANITARIA: DINASTIA® es un insecticida piretroide que controla eficazmente insectos del orden de lepidópteros, coleópteros, homópteros y otros.

MODO DE ACCIÓN: DINASTIA® es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión.

MECANISMO DE ACCIÓN: Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, produciendo inactividad de movimientos. Es un producto liposoluble, lo cual permite ser absorbido por la pared vegetal. Esta propiedad le permite tener una excelente resistencia al lavado en caso de lluvias fuertes.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: En cultivos de ciclo corto se recomienda máximo dos aplicaciones entre los primeros treinta días de desarrollo de la planta, durante la rotación.

PERIODO DE CARENIA: Arroz 20 días, Maíz 30 días.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN: DINASTIA® es un insecticida que posee gran espectro de actividad. Se puede aplicar por cualquiera de los métodos de aplicación foliar. Por ser liposoluble tiene excelente resistencia a lavado en caso de lluvias. Vierta la mitad de agua y agregue la dosis recomendada de DINASTIA®. Agite la mezcla y complete con agua el resto.

Mantenga el agitador funcionando durante las operaciones de llenar, mezclar y rociar. Asegúrese de contar con el equipo necesario para dosificar, mezclar y aplicar el producto. Lavar el equipo al terminar la aplicación. Asegúrese de utilizar siempre el equipo de protección personal consistente en: botas de hule, mascarilla, anteojos protectores, guantes, dosificador y aplicador

COMPATIBILIDAD DE MEZCLA: DINASTIA® es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola, a excepción de Caldo Bordelés, Aserniato de calcio o Zinc. A las dosis recomendadas el producto no es fitotóxico a los cultivos antes mencionados.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: II (Moderadamente peligroso)

COMPATIBILIDAD CON EL CULTIVO: No presenta fitotoxicidad utilizado a la dosis recomendada y con los métodos sugeridos.

PRECAUCIONES: El producto puede ser nocivo en caso de inhalación o ingestión. Puede ser tóxico para organismos acuáticos. Almacene el producto fuera del alcance de los niños, bajo llave, en un sitio seguro, fresco, seco y bien ventilado, separado de alimentos y drogas de consumo humano o animal, ropa, calzado y utensilios del hogar

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de ingestión no induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.

GUÍA PARA EL MÉDICO: Aplique tratamiento sintomático.

Para la Sierra: CIATOX, Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Dra. Consuelo Meneses M, Teléfonos de contacto.: 593- 2- 2906162 Ext. 221/ 593- 2- 2565858 3226268 Línea gratuita: 1800 836366. En caso de intoxicación, derrame o incendio: Cisproquim (Quito, La Sierra, Centro y Norte): 1800-59-3005

Para la Costa: CITOX Centro de Información Toxicológico. Dr. Jorge Luis Gaibor Carpio Tel.: (5934)04245-1022 Móvil: 098275025 Fax: (5934)042452700 Ext. 4241. En caso de intoxicación accidental dirigirse al Dr. Alfredo Noboa Montalvo. Celular 09-9426154 (Guayaquil)

PRESENTACIÓN:
Envase x 1 litro.

REGISTRO MAGAP: 21 - I 13 / NA

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS cc/ha	PC
ARROZ <i>Oryza sativa</i>	Langosta - <i>Spodoptera frugiperda</i>	75 - 100	20 DÍAS
MAÍZ <i>Zea mays</i>	Cogollero - <i>Spodoptera frugiperda</i>	100 - 150	30 DÍAS

*PC: Periodo de carencia

Bayer S.A.
Calle Luxemburgo N34-359 y Portugal, Edificio Cosmopolitan piso 6
Quito - Ecuador

Tel +593 (2) 3975200
Línea de Servicio al Cliente 1800-2293772
www.bayerandina.com