



Nombre: **ELTRA 48**

Enero 2019

Página 1 de 2

FICHA TECNICA
ELTRA 48
INSECTICIDA AGRICOLA
Concentrado Emulsionable (EC)

REGISTRO NACIONAL 8 – N1 /NA
Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Composición:

Carbosulfan..... **480 g/l.**
2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl (dibutylaminothio)methylcarbamate, de formulacion a 20°
centígrados.
Aditivos:**c.s.p. 1 litro.**

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

GENERALIDADES

ELTRA 48 es un insecticida del grupo del cultivo de los carbamatos que controla gusano blanco en el cultivo de papa.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENIA
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gusano blanco (<i>Premnotypes vorax</i>)	2.5 l/ha*	30 días

*La dosis para gusano blanco es de 205 l/ha para cada época de aplicación (siembra, deshierba y aporque).

Periodo de reingreso: Esperar un mínimo de 24 horas para ingresar al área tratada. en caso de que se requiera ingresar antes, utilice equipo de protección completo.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

De acuerdo a la época y nivel de infestación realizar un máximo de tres (3) aplicaciones por ciclo de cultivo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Llenar la mitad del tanque de aspersión con agua limpia. Añadir la cantidad necesaria de producto al agua removiendo al mismo tiempo, llene el tanque de aspersión con agua hasta el nivel requerido manteniendo la agitación, para garantizar la homogenización de la mezcla, mantener la agitación durante la aplicación.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

FITOTOXICIDAD: El producto no es Fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis indicada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso corriente salvo aquellos de naturaleza alcalina. En caso de mezcla con otros productos, se recomienda bajo responsabilidad del usuario realizar evaluaciones previas a pequeña escala, con el fin de determinar física y Fito-compatibilidad de la mezcla a usar.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **OJOS:** lavar con agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación ocurre y persiste, obtenga atención médica.
- **PIEL:** Lave con cantidades suficientes de jabón y agua. Si la irritación ocurre y persiste, obtenga atención médica.
- **INGESTION:** No induzca el vómito y no dé líquidos de cualquier tipo a la persona. Nunca induzca el vómito o dé algo por la boca a una persona inconsciente. Consulte al médico inmediatamente.
- **INHALACION:** remueva el paciente al aire fresco. Si respira con dificultad o el malestar ocurre y persiste, obtenga atención médica.

GUÍA PARA EL MÉDICO

Este producto es moderadamente tóxico si se ingiere, y ligeramente tóxico si se inhala o absorbe a través de la piel. Es moderadamente irritante a los ojos y moderadamente irritante a la piel. Carbosulfan es un inhibidor reversible de la colinesterasa. El antídoto para este plaguicida es el sulfato de atropina. Se requiere soporte respiratorio con remoción de excreciones, manteniendo el paciente en un lugar ventilado y si es necesario brindando ventilación artificial. Si la cianosis no se presenta: Adultos: inicie el tratamiento suministrando 2 mg de Atropina por vía intravenosa o intramuscular, si es necesario, y repita con 0.4 – 2.0 mg de atropina con intervalos de 15 minutos hasta que la atropinización ocurra (taquicardia, piel colorada, boca seca, midriasis); Niños menores de 12 años – dosis inicial = 0.05 mg/Kg de peso del cuerpo y repetir la dosis = 0.02 – 0.05 mg/Kg de peso del cuerpo. El uso de oximas tales como 2-PAM es controvertido. Observe el paciente para asegurar que estos síntomas no sean recurrentes como que la atropinización desaparezca. Si se presentan en los ojos, instile una gota de homatropina. Contiene hidrocarburos aromáticos que pueden producir severa neumonitis si se aspira durante el vómito. Considerando esto debe procederse a lavado gástrico colocando un tubo endotraqueal. El tratamiento además debe implicar la remoción del paciente del lugar de exposición seguido de tratamiento y cuidados de soporte.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta cuando corresponda”



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.

Para mayor información dirigirse a:

FMC LATINOAMERICA S.A. (593 04) 3902086
Guayaquil - Ecuador

ADVERTENCIA: “Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturándolo o perforándolo, y devuélvalo al distribuidor para su disposición final”.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO – DAÑINO**