FMC Latinoamérica S.A.

Km. 6,5 Vía Samborondón CC: Plaza Lagos, Torre Rambla

Piso 1. Oficina 1.1 Guayaguil - Ecuador Teléfono: (593 04) 3902089



Nombre: **MAGNUS** Agosto 2019

Pagina 1 de 3

FICHA TECNICA MAGNUS

FERTILIZANTE QUIMICO "APLICACIÓN FOLIAR"

REGISTRO NACIONAL 784-F-AGR Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

"CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL"

GENERALIDADES

MAGNUS es un producto a base de 2 macronutrientes secundarios y esenciales, Magnesio y Azufre son claves para la activación y optimización de fotosíntesis y como componente esencial de las estructuras proteicas vegetales.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	EPOCA DE APLICACION	VIA Y FRECUENCIA DE APLICACION
Tomate Riñon (Solanum lycopersicum)	1,0 L/ha	Desarrollo vegetativo, ramificación.	FOLIAR. Aplicar a partir de que se tenga masa foliar suficiente, al inicio del proceso de ramificación y extensión de brotes, repetir si es necesario a medio engorde.
Aguacate (Persea americana)	1,0 L/ha	Desarrollo vegetativo	FOLIAR. Aplicar tan pronto como sea posible a partir de brotaciòn activa con masa foliar suficiente, repetir si es necesario a medio engorde.
Arroz (Oryza sativa)	1,0 L/ha	Aparición de 3º noja,	FOLIAR. Primer tratamiento a partir de la 3ª hoja hasta Macollaje, repitiendo si fuera necesario a los 30 días.
Banano (Mussa acuminata AAA)	0,5 L/ha		FOLIAR. Tratar durante la emisión foliar, repetir según sea necesario durante el desarrollo de hojas y nuevas emisiones.

Nombre: MAGNUS Agosto 2019

Pagina 2 de 3

Caña de Azúcar (Saccharum officinarum)	1,0 L/ha		FOLIAR. Aplicar a la emisión entre 4ª y 8ª hoja, al inicio de crecimiento vegetativo activo.
Cacao (Theobroma cacao)	1,0 L/ha	Desarrollo vegetativo y medio engorde.	FOLIAR. Aplicar tan pronto como sea posible a partir de brotaciòn activa con masa foliar suficiente, repetir si es necesario a medio engorde.
Frutilla (Fragaria sp.)	1,0 L/ha	ramificación, extensión de brotes y medio	FOLIAR. Aplicar a partir de que se tenga masa foliar suficiente, al inicio del proceso de ramificación y extensión de brotes, repetir si es necesario a medio engorde.
Mango (Mangifera indica)	1,0 L/ha	Desarrollo vegetativo.	FOLIAR. Aplicar tan pronto como sea posible a partir de brotaciòn activa con masa foliar suficiente, repetir si es necesario a medio engorde.
Papa (Solanum tuberosum)	1,0 L/ha	Desarrollo vegetativo.	FOLIAR. A partir de desarrollo vegetativo activo, repetir a medio llenado si fuera necesario.
Soliago (Solidago canadensis)	3,0 L/ha		Tres aplicaciones con un intervalo entre aplicaciones de 7 dias.

[&]quot;La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo".

APLICACIÓN:

No es recomendable aplicar este producto en condiciones de alta radiación solar o muy alta temperatura y bajos niveles de humedad relativa ambiental. Si es posible realice las aplicaciones del producto a primera hora de la mañana o última de la tarde.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agite bien el envase antes de abrir y usarlo. El equipo de aspersión debe estar limpio. Llenar la mitad del tanque de pulverización con agua, comenzar la agitación y añadir la cantidad requerida de MAGNUS. Enjuague bien el envase y agregue los enjuagues al tanque, complete el llenado y aplique sin demora. Mantener la agitación en todo momento. Limpie bien el equipo de tratamiento después de su uso.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

Fitotoxicidad: No es fitotóxico a los cultivos, a las dosis y las diluciones indicadas en esta etiqueta.

Compatibilidad:

MAGNUS es física y químicamente compatible con la mayoría de productos agroquímicos. Lea siempre cuidadosamente las etiquetas de terceros productos antes de mezclarse con MAGNUS. Es recomendable hacer una pequeña prueba de compatibilidad con los productos que se quieran mezclar.

Nombre: MAGNUS Agosto 2019

Pagina 3 de 3

GUÍA PARA EL MÉDICO

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta cuando corresponda"

