

FICHA TECNICA MULTIPLE

FERTILIZANTE QUIMICO
"APLICACIÓN FOLIAR"

REGISTRO NACIONAL 785-F-AGR
Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Magnesio (MgO).....	14,0 % p/v
Cobre (Cu).....	10,8 % p/v
Manganeso (Mn).....	33,0 % p/v
Zinc (Zn).....	8,4 % p/v

"CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL"

GENERALIDADES

MULTIPLE es un producto multi mineral con contenido en magnesio, manganeso, zinc y cobre. Con un balance especialmente diseñado para combatir las deficiencias de estos nutrientes en cualquier cultivo, y especialmente indicado en las fases de mayor desarrollo del cultivo.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	EPOCA DE APLICACION	VIA Y FRECUENCIA DE APLICACION
Tomate Riñón (<i>Solanum lycopersicum</i>)	0,75 L/ha, en 1000 L de Agua.	Desarrollo vegetativo, ramificación.	FOLIAR. Aplicar a partir de que se tenga masa foliar suficiente, al inicio del proceso de ramificación y extensión de brotes, repetir si es necesario a medio engorde.
Aguacate (<i>Persea americana</i>)	1,0 L/ha, en 600 L de agua	Desarrollo vegetativo y medio engorde.	FOLIAR. Aplicar a partir de brotación activa con masa foliar suficiente, repetir si es necesario a medio engorde.
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	0,5 L/ha, en 250 L de agua.	Aparición de 3ª hoja, Macollaje.	FOLIAR. Primer tratamiento a partir de la 3ª hoja hasta Macollaje, repitiendo si fuera necesario a los 30 días.
Banano (<i>Mussa acuminata</i> AAA)	0,5 L/ha, en 20 L de agua (aérea)	Emisión foliar y desarrollo.	FOLIAR. Tratar durante la emisión foliar, repetir según sea necesario durante el desarrollo de hojas y nuevas emisiones.

Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	0,75 L/ha, en 250 L de Agua.	Inicio de crecimiento vegetativo.	FOLIAR. Aplicar a la emisión entre 4ª y 8ª hoja, al inicio de crecimiento vegetativo activo.
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	0,75 L/ha, en 500 L de Agua.	Desarrollo vegetativo y medio engorde.	FOLIAR. Aplicar tan pronto como sea posible a partir de brotación activa con masa foliar suficiente, repetir si es necesario a medio engorde.
Frutilla (<i>Fragaria sp.</i>)	0,75 L/ha, en 500 L de Agua.	Desarrollo vegetativo, ramificación, extensión de brotes y medio engorde.	FOLIAR. Aplicar a partir de que se tenga masa foliar suficiente, al inicio del proceso de ramificación y extensión de brotes, repetir si es necesario a medio engorde.
Mango (<i>Mangifera indica</i>)	1,0 L/ha, en 500 L de Agua.	Desarrollo vegetativo.	FOLIAR. Aplicar tan pronto como sea posible a partir de brotación activa con masa foliar suficiente, repetir si es necesario a medio engorde.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	0,75 L/ha, en 500 L de Agua.	Desarrollo vegetativo.	FOLIAR. A partir de desarrollo vegetativo activo, repetir a medio llenado si fuera necesario.
Soliago (<i>Solidago canadensis</i>)	1,0 L/ha, en 400 L de Agua.	En fase de crecimiento activo (20 días después de la poda).	Tres aplicaciones con un intervalo entre aplicaciones de 7 días.

“La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”.

APLICACIÓN:

No es recomendable aplicar este producto en condiciones de alta radiación solar o muy alta temperatura y bajos niveles de humedad relativa ambiental. Si es posible realice las aplicaciones del producto a primera hora de la mañana o última de la tarde.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agite bien el envase antes de abrir y usarlo. El equipo de aspersion debe estar limpio. Llenar la mitad del tanque de pulverización con agua, comenzar la agitación y añadir la cantidad requerida de MAGNUS. Enjuague bien el envase y agregue los enjuagues al tanque, complete el llenado y aplique sin demora. Mantener la agitación en todo momento. Limpie bien el equipo de tratamiento después de su uso.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

Fitotoxicidad: No es fitotóxico a los cultivos, a las dosis y las diluciones indicadas en esta etiqueta.

Compatibilidad:

MULTIPLE es física y químicamente compatible con la mayoría de productos agroquímicos. Lea siempre cuidadosamente las etiquetas de terceros productos antes de mezclarse con MULTIPLE. Es recomendable hacer una pequeña prueba de compatibilidad con los productos que se quieran mezclar.

GUÍA PARA EL MÉDICO

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela etiqueta cuando corresponda”



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.

Para mayor información dirigirse a:
FMC LATINOAMERICA S.A. (593 04) 3902086
Guayaquil - Ecuador