



FICHA TÉCNICA

TERCO EMULSIFICANTE

Revisión: 04

Fecha: 06/Julio/2017

Página: 1 de 1

Formulador:	Agripac S.A.
Tipo de Producto:	Coadyuvante Agrícola
Ingrediente activo:	Mezcla de Alquilariletoxilatos 850 g/l Trioleato de Sorbitol 10 g/l
Grupo Químico:	Surfactante no iónico
Nombre Químico:	Trioleato de sorbitol, Alquilariletoxilato, Aceite parafínico
Tipo de Formulación:	Concentrado Soluble (CS)
Categoría Toxicológica:	IV (Franja verde)
Acción Fitosanitaria:	Coadyuvante utilizado en la preparación de emulsiones a base de aceite y agua.
Modo de acción:	Disminuye la tensión superficial del agua facilitando la mezcla completa de los agroquímicos, en especial de las formulaciones con base en aceite. Estabiliza las emulsiones por tiempo prolongado.
Presentaciones Comerciales:	1 l, 20 l, 1 gal, 5 gal, 200 l

N° de Registro: 031 – COAD 1 – SESA – U

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

EMULSIONES CON FUNGICIDAS USADOS EN:	DOSIS DE EMULAGRO 86	DOSIS EN ACEITE	CONCENTRACIÓN
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA) Plátano (<i>Musa paradisiaca</i>)	10 ml	1 litro	1 %

Otros productos o cultivos pueden requerir variaciones en las dosis recomendadas.

Modo de empleo:	Para preparar la emulsión, agregue al tanque de mezcla el aceite agrícola más la dosis recomendada de TERCO [®] EMULSIFICANTE, manteniendo agitación constante agregue los plaguicidas y complete el volumen requerido con agua. Para los polvos mojables o granulados dispersables se facilita la operación si se dispone de tanques de pre-mezcla.
Epoca y frecuencia de aplicación:	Depende del plaguicida usado en la mezcla.
Período de carencia:	Depende del plaguicida usado en la mezcla.
Reingreso al área tratada:	Depende del plaguicida usado en la mezcla.
Compatibilidad:	Es compatible con la mayoría de plaguicidas miscibles en aceite.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).

Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado

Nunca transporte los plaguicidas junto con productos alimenticios.

Después de la aplicación, lavar el equipo de aspersión interna y externamente en el campo y asperjar el líquido de enjuague en el cultivo.

Lavar las boquillas de aspersión con agua a una presión más alta que la normal de aplicación.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Recolectar los envases y entregarlos distribuidor para su disposición final.