



Nombre: **THIO-S**

Noviembre 2019

Página 1 de 2

FICHA TECNICA **THIO-S**

FERTILIZANTE QUIMICO
"APLICACIÓN FOLIAR"

REGISTRO NACIONAL 720-F-AGR
Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Nitrógeno (N)15,1 % p/v
Azufre (S).34,5 % p/v

"CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL"

GENERALIDADES

THIO-S es un producto especialmente balanceado de los macronutrientes azufre y nitrógeno. Clave para el aporte de estos elementos en los primeros estadios de desarrollo del cultivo, cuando también son requeridos nutrientes como el nitrógeno. Es un producto clave para el estímulo proteico y enzimático de los cultivos. Formulación de rápida absorción y totalmente soluble.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	EPOCA DE APLICACION	VIA Y FRECUENCIA DE APLICACION
Tomate Riñón (<i>Solanum lycopersicum</i>)	7,5 L/ha	Segunda semana de desarrollo (crecimiento vegetativo)	FOLIAR. Tres aplicaciones con un intervalo entre aplicaciones de una semana
Aguacate (<i>Persea americana</i>)	1,5 L/ha	En cuaje e inicio de engorde.	FOLIAR. Aplicar a partir de fruta cuajada e inicio de engorde en adelante con intervalos de 15 días, si fuera necesario repetir.
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	1,5 L/ha	En la aparición del 1er nódulo y emergencia de la espiga.	FOLIAR. Aplicar a partir de la formación del primer nódulo. Una segunda aplicación durante la emergencia de la inflorescencia o espiga.
Banano (<i>Mussa acuminata AAA</i>)	1,5 L/ha	Durante el ciclo del cultivo.	FOLIAR. Durante todo el ciclo del cultivo, en todas las fases en que haya hoja emitida joven.

Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	1,5 L/ha	En desarrollo vegetativo.	FOLIAR. Aplicar a partir de la aparición de la 6-7 hoja en adelante.
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	1,5 L/ha	Cuajado de fruta y engorde.	FOLIAR. Aplicar a partir de fruta cuajada e inicio de engorde en adelante con intervalos de 15 días si fuera necesario repetir.
Frutilla (<i>Fragaria sp.</i>)	1,5 L/ha	Desarrollo vegetativo, prefloración y cuaje.	FOLIAR. Aplicar a partir de fruta cuajada e inicio de engorde en adelante con intervalos de 15 días si fuera necesario repetir.
Mango (<i>Mangifera indica</i>)	1,5 L/ha	Desarrollo vegetativo y brotación.	FOLIAR. Aplicar a partir de fruta cuajada e inicio de engorde en adelante con intervalos de 15 días si fuera necesario repetir.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	1,5 L/ha	A la emergencia del cultivo.	FOLIAR. Realizar primera aplicación después del 100% de emergencia, pudiéndose repetir el tratamiento a los 18-20 días.
Rosas (<i>Rosa sp.</i>)	1,5 L/ha	Durante el ciclo del cultivo.	FOLIAR. Durante todo el ciclo del cultivo, especialmente en desarrollo vegetativo evitando las aplicaciones en estado reproductivo.

“La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

AGÍTESE BIEN ANTES ABRIR Y USARLO. El equipo de aspersión debe estar limpio. Llenar la mitad del tanque de pulverización con agua, comenzar la agitación y añadir la cantidad requerida de **THIO-S** y luego el resto del agua. Enjuague bien el envase y agregue los enjuagues al tanque, complete el llenado y aplique sin demora. Mantener la agitación del tanque durante todo el proceso de aspersión en el campo. No es recomendable aplicar este producto en condiciones de alta radiación solar o con temperaturas extremas y bajos niveles de humedad relativa ambiental. Si es posible realice las aplicaciones del producto a primera hora de la mañana o última de la tarde. Limpie bien el equipo de tratamiento después de su uso.

INCOMPATIBILIDAD

THIO-S es un producto especialmente balanceado de los macronutrientes azufre y nitrógeno. Clave para el aporte de estos elementos en los primeros estadios de desarrollo del cultivo, cuando también son requeridos nutrientes como el nitrógeno. Es un producto clave para el estímulo proteico y enzimático de los cultivos. Formulación de rápida absorción y totalmente soluble.

GUÍA PARA EL MÉDICO

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta cuando corresponda”



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.

Para mayor información dirigirse a:
FMC LATINOAMERICA S.A. (593 04) 3902086
Guayaquil - Ecuador