



# Trivia®

FUNGICIDA AGRÍCOLA  
Polvo mojable (WP)

**INGREDIENTE ACTIVO:** Propineb + Fluopicolide.

**FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:** TRIVIA® es un polvo mojable (WP) que contiene 667 g de Propineb + 60 g de Fluopicolide por kg de producto comercial.

**ACCIÓN FITOSANITARIA:** TRIVIA® protege por fuera y cura por dentro de la hoja, combate la lancha antes y después de establecida. No afecta la fotosíntesis por su coloración blanca. Su parte protectante se adhiere mejor a la hoja. No se acumula dentro de la planta, presentando una mejor dispersión en la hoja. En invierno presenta su máxima potencia.

**MODO DE ACCIÓN:** TRIVIA® es un fungicida preventivo-curativo por las características que le dan sus ingredientes activos.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** Propineb es un inhibidor multisitio y Fluopicolide con acción en proteínas específicas, es esencial en las interacciones con la membrana celular.

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Se recomienda la aplicación de TRIVIA® con base en los resultados del monitoreo de las diferentes enfermedades. TRIVIA® debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones de Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas FRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.

**PERIODO DE CARENCIA:** En papa la última aplicación debe efectuarse 14 días antes de la cosecha. En uva 30 días.

**PERIODO DE REINGRESO:** 12 horas después de la aplicación.

**MÉTODO DE APLICACIÓN:**

**Estados iniciales de cultivo:** 1 funda de 400 g por tanque de 200 litros.

**Comienzo de lluvias:** 2 fundas de 400 g por tanque de 200 litros.

- Para conseguir una buena mezcla se debe diluir la dosis recomendada en un poco de agua hasta conseguir una suspensión homogénea.
- Vertir esta premezcla en el tanque del equipo que va a utilizarse, con la cantidad de agua necesaria. No deje de agitar el contenido.

**COMPATIBILIDAD DE MEZCLA:** Antes de realizar mezclas se recomienda realizar

previamente pruebas de fitocompatibilidad con el producto que se desea mezclar.

**CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:** Categoría III, Ligeramente peligroso.

**COMPATIBILIDAD CON EL CULTIVO:** TRIVIA® en las dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo, se recomienda pruebas de fitocompatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos

**PRECAUCIONES:** Almacene el producto fuera del alcance de los niños, bajo llave, en un sitio seguro, fresco, seco y bien ventilado, separado de alimentos y drogas de consumo humano o animal, ropa, calzado y utensilios del hogar.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de ingestión no induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.

**GUÍA PARA EL MÉDICO:** Aplique tratamiento sintomático.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:  
1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 horas del día.

**PRESENTACIÓN:**

Funda x 400 g

**REGISTRO MAG.:** 161 - F 1 / NA

**RECOMENDACIONES DE USO:**

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS (kg/ha)	PC (Periodo de Carencia)
PAPA <i>Solanum tuberosum</i>	Lancha <i>Phytophthora infestans</i>	1.5	14
UVA <i>Vitis vinífera L.</i>	MILDIU <i>Plasmopara viticola</i>	*1.5	30

\* Uva dosis equivalente a 0.25% con un gasto de agua de 600l/ha.

Bayer S.A.  
Calle Luxemburgo N34-359 y Portugal, Edificio Cosmopolitan piso 6  
Quito - Ecuador

Tel +593 (2) 3975200  
Línea de Servicio al Cliente 1800-2293772  
www.bayerandina.com