



# FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA

## VENTAJA®

Revisión: 01

Fecha: 03/Junio/2017

Página: 1 de 1

<b>Formulador:</b>	AGRIPAC S.A.
<b>Tipo de Producto:</b>	Insecticida-Acaricida Agrícola
<b>Ingrediente activo:</b>	Abamectin 18 g/l
<b>Tipo de Formulación:</b>	Concentrado Emulsionable (EC)
<b>Grupo Químico (IUPAC):</b>	Avermectina
<b>Categoría Toxicológica:</b>	II: Moderadamente peligroso (Franja amarilla)
<b>Modo de acción:</b>	Insecticida acaricida con acción de contacto e ingestión.
<b>Mecanismo de acción:</b>	Abamectina promueve la liberación pre-sináptica del neurotransmisor inhibidor ácido gama aminobutírico (GAMA), de manera que bloquea la transmisión de impulsos nerviosos, causando la muerte del insecto por parálisis.
<b>Presentaciones Comerciales:</b>	100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 4 l, 5 l, 20 l, 200 l

<b>N° de Registro Nacional:</b>	06 – A4 / NA - CL 1
---------------------------------	---------------------

### INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS l/ha	VOLUMEN DE AGUA l/ha
<b>Papaya</b> ( <i>Carica papaya</i> )	<b>Acaro rojo</b> ( <i>Tetranychus cinnabarinus</i> )	0.10	250
<b>Papa</b> ( <i>Solanum tuberosum</i> )	<b>Minador</b> ( <i>Liriomyza huidobresis</i> )	0.45	600

<b>Modo de empleo:</b>	Para preparar la mezcla, agregue agua en el tanque de preparación hasta la mitad, vierta la dosis recomendada de VENTAJA® y mezcle hasta obtener una emulsión estable, continúe adicionando agua hasta completar el volumen requerido. Se recomienda calibrar el equipo de aspersión antes de cada aplicación para lograr una distribución uniforme. Aplicar VENTAJA® en rotación con otros insecticidas que presenten diferente mecanismo de acción.
<b>Época y frecuencia de aplicación:</b>	<b>PAPAYA:</b> Se recomienda realizar 2 aplicaciones con una frecuencia de 7 días, en presencia del ácaro rojo. <b>PAPA:</b> Realizar una aplicación en presencia de los primeros adultos de minador.
<b>Período de carencia:</b>	<b>PAPAYA:</b> 40 días <b>PAPA:</b> 3 días
<b>Reingreso al área tratada:</b>	24 horas.
<b>Compatibilidad:</b>	Es compatible con Captan. Se recomienda hacer una pequeña mezcla con los productos de los cuales no se conoce la compatibilidad y observar durante 5 minutos.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).
Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado
Nunca transporte los plaguicidas junto con productos alimenticios.
Después de la aplicación, lavar el equipo de aspersión interna y externamente en el campo y asperjar el líquido de enjuague en el cultivo.
Lavar las boquillas de aspersión con agua a una presión más alta que la normal de aplicación.



## FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA VENTAJA®

Revisión: 01

Fecha: 03/Junio/2017

Página: 2 de 2

### DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Recolectar los envases y entregarlos distribuidor para su disposición final.